



追加（3回目）接種後の副反応の発現割合【1、2回目接種：ファイザー社、追加接種：ファイザー社】

※令和4年2月18日 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）資料「ファイザー社ワクチン初回接種者に対する3回目接種後中間報告（3）」より抜粋





新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）

全身倦怠感

Data Cutoff Date
2022/1/28 9:00

コミュニティ筋注初回接種後のコミュニティ筋注追加接種後



	男女計	男	女
20歳代	498	116	382
30歳代	638	222	416
40歳代	702	199	503
50歳代	572	168	404
60歳以上	216	114	102
全体	2,626	819	1,807





新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）

頭痛

Data Cutoff Date
2022/1/28 9:00

コミュニティ筋注初回接種後のコミュニティ筋注追加接種後



	男女計	男	女
20歳代	498	116	382
30歳代	638	222	416
40歳代	702	199	503
50歳代	572	168	404
60歳以上	216	114	102
全体	2,626	819	1,807

