




# 【12歳以上】ファイザー社ワクチン 比較表

XBB.1.5株対応1価ワクチンは薬事承認前のため、  
令和5年8月10日時点における予定の情報です。

別紙1

	ファイザー社（12歳以上用） XBB.1.5株対応1価ワクチン	ファイザー社（12歳以上用） BA.4/5株対応2価ワクチン	ファイザー社（12歳以上用） 従来株ワクチン
キャップの色	グレー 	グレー 	紫 
接種時期	<b>令和5年9月20日～ 初回接種、追加接種</b>	<b>令和5年9月19日まで</b> 初回接種（R5.8.7適用）、追加接種	<b>令和5年9月19日まで</b> 初回接種
希釈	希釈不要	希釈不要	希釈必要（生理食塩液1.8mL）
接種量	0.3mL	0.3mL	0.3mL
1バイアル 当たりの採取数	1バイアル当たり6回接種分	1バイアル当たり6回接種分	1バイアル当たり6回接種分
冷凍保管温度、 有効期限	-75℃±15℃、 <b>18か月</b> ※-20℃±5℃での保管は× ※解凍後の再凍結は×	-75℃±15℃、24か月 ※-20℃±5℃での保管は× ※解凍後の再凍結は×	75℃±15℃、24か月 -20℃±5℃、14日間 ※解凍後の再凍結は×
冷蔵保管時 (2～8℃)の 保管期限	10週間（ <b>18か月</b> の有効期限内で）	10週間（24か月の有効期限内で）	1か月（31日間） （24か月の有効期限内で）
その他	○室温（8℃～30℃）に移行後は、 穿針前であれば24時間保存可能 ○穿針後は、2℃～30℃で12時間 以内に使用	○室温（8℃～30℃）に移行後は、 穿針前であれば24時間保存可能 ○穿針後は、2℃～30℃で12時間 以内に使用	○室温（8℃～30℃）に移行後は、 2時間以内に解凍・希釈が必要 ○希釈後は、2℃～30℃で6時間 以内に使用