


【5歳～11歳】ファイザー社ワクチン 比較表

| | ファイザー社（5歳～11歳用） XBB.1.5株対応1価ワクチン | ファイザー社（5歳～11歳用） BA.4/5株対応2価ワクチン | ファイザー社（5歳～11歳用） 従来株ワクチン |
|--------------------------|--|---|---|
| キャップの色 | オレンジ  | オレンジ  | オレンジ  |
| 接種時期 | 令和5年9月20日～ 初回接種、追加接種 | 令和5年9月19日まで 初回接種（R5.8.7適用）、追加接種 | 令和5年9月19日まで 初回接種 |
| 希釈 | 希釈必要（生理食塩液1.3mL） | 希釈必要（生理食塩液1.3mL） | 希釈必要（生理食塩液1.3mL） |
| 接種量 | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL |
| 1バイアル 当たりの採取数 | 1バイアル当たり10回接種分 | 1バイアル当たり10回接種分 | 1バイアル当たり10回接種分 |
| 冷凍保管温度、 有効期限 | -75℃±15℃、 18か月 ※-20℃±5℃での保管は× ※解凍後の再凍結は× | -75℃±15℃、24か月 ※-20℃±5℃での保管は× ※解凍後の再凍結は× | -75℃±15℃、24か月 ※-20℃±5℃での保管は× ※解凍後の再凍結は× |
| 冷蔵保管時 (2～8℃)の 保管期限 | 10週間（ 18か月 の有効期限内で） | 10週間（24か月の有効期限内で） | 10週間（24か月の有効期限内で） |
| その他 | ○室温（8℃～30℃）に移行後は、 24時間以内に使用 ○希釈後は、2℃～30℃で12時間 以内に使用 | ○室温（8℃～30℃）に移行後は、 24時間以内に使用 ○希釈後は、2℃～30℃で12時間 以内に使用 | ○室温（8℃～30℃）に移行後は、 24時間以内に使用 ○希釈後は、2℃～30℃で12時間 以内に使用 |