

予防接種の対象年齢と接種計画例(生後90月未満のもの)

種別	年齢	2月	6月	7月	9月	12か月	15か月	18か月	24か月	36か月	48か月	60か月	90か月
						(1歳)			(2歳)	(3歳)	(4歳)	(5歳)	(7歳半)
ロタ (注1)		ロタリックス (2回) 6週～24週 ロタテック (3回) 6週～32週 ※接種するワクチンによって、接種時期及び接種回数が異なります。											
B型肝炎		3回接種											
小児用肺炎球菌 (注2)		初回接種 (3回) 追加接種											
五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ)		初回接種 (3回) 追加接種											
四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)		初回接種 (3回) 追加接種											
ヒブ (注2)		初回接種 (3回) 追加接種 ※標準的には追加接種は初回接種終了後7～13か月の間隔をおく											
BCG		1回接種											
麻疹・風疹混合		1期 2期											
水痘		1回目 2回目 ※標準的には2回目は1回目接種後6～12か月の間隔をおく											
日本脳炎		初回接種 2回 追加接種 小学校入学までに基礎免疫を完了しましょう (3歳) (4歳)											

(注1) ロタはロタリックスとロタテックのどちらかを接種します。接種回数が異なります。

(注2) 小児用肺炎球菌とヒブは、接種を開始する月齢によって接種回数が異なります。

標準的な接種年齢(月齢)
 法令で定められている接種年齢(月齢)